

اختبار الهيموغلوبين السكري A1C للكشف عن الإصابة بداء السكري

يمكن استخدام اختبار الهيموغلوبين السكري A1C لتشخيص داء السكري أو السيطرة عليه عن طريق قياس متوسط غلوكوز الدم (مستويات السكر في الدم) خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

بالنسبة لمعظم الأشخاص المصابين بداء السكري، تعد نسبة 7% أو أقل نسبة مثالية في اختبار الهيموغلوبين السكري A1C بينما تعبر المستويات المرتفعة في اختبار الهيموغلوبين السكري A1C عن تعرضك لخطر الإصابة بمضاعفات داء السكري.

تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بشأن إجراء اختبار الهيموغلوبين السكري A1C وما مدى تكراره الذي يعد مناسبًا لك.

مستوى A1C	التشخيص
أقل من 5.7%	عادي
5.7% إلى 6.4%	مقدمات لداء السكري
6.5% فأكثر	داء السكري

لمزيد من المعلومات حول المساواة الصحية،
تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني

www.fda.gov/healthequity



مكتب صحة الأقليات والمساواة الصحية

اختبار الهيموغلوبين السكري A1C للكشف عن الإصابة بداء السكري

يمكن استخدام اختبار الهيموغلوبين السكري A1C لتشخيص داء السكري أو السيطرة عليه عن طريق قياس متوسط غلوكوز الدم (مستويات السكر في الدم) خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

بالنسبة لمعظم الأشخاص المصابين بداء السكري، تعد نسبة 7% أو أقل نسبة مثالية في اختبار الهيموغلوبين السكري A1C بينما تعبر المستويات المرتفعة في اختبار الهيموغلوبين السكري A1C عن تعرضك لخطر الإصابة بمضاعفات داء السكري.

تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بشأن إجراء اختبار الهيموغلوبين السكري A1C وما مدى تكراره الذي يعد مناسبًا لك.

مستوى A1C	التشخيص
أقل من 5.7%	عادي
5.7% إلى 6.4%	مقدمات لداء السكري
6.5% فأكثر	داء السكري

لمزيد من المعلومات حول المساواة الصحية،
تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني

www.fda.gov/healthequity

مكتب صحة الأقليات والمساواة الصحية





اختبار الهيموغلوبين السكري A1C للكشف عن الإصابة بداء السكري

يمكن استخدام اختبار الهيموغلوبين السكري A1C لتشخيص داء السكري أو السيطرة عليه عن طريق قياس متوسط غلوكوز الدم (مستويات السكر في الدم) خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

بالنسبة لمعظم الأشخاص المصابين بداء السكري، تعد نسبة 7% أو أقل نسبة مثالية في اختبار الهيموغلوبين السكري A1C بينما تعبر المستويات المرتفعة في اختبار الهيموغلوبين السكري A1C عن تعرضك لخطر الإصابة بمضاعفات داء السكري.

تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بشأن إجراء اختبار الهيموغلوبين السكري A1C وما مدى تكراره الذي يعد مناسبًا لك.

مستوى A1C	التشخيص
أقل من 5.7%	عادي
5.7% إلى 6.4%	مقدمات لداء السكري
6.5% فأكثر	داء السكري

لمزيد من المعلومات حول المساواة الصحية،
تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني

www.fda.gov/healthequity