

건강 상태를 확인하고  
B형 간염을 치료하세요

B형 간염에  
노출되었다고 생각되면  
의료 서비스 제공자에게  
검사를 요청하세요.

FDA(미 식품의약국)는 임상 시험에  
대한 다양한 참여를 장려합니다.

임상 시험이 귀하에게 적합하다고  
생각하시면 담당 의료 서비스  
제공자와 상담하십시오.

다음 사이트에서 해당 지역에서  
시행되는 임상 시험을 검색할 수  
있습니다. [www.clinicaltrials.gov](http://www.clinicaltrials.gov)

#### 자세한 정보

 [www.fda.gov/HealthEquity](http://www.fda.gov/HealthEquity)

 [HealthEquity@fda.hhs.gov](mailto:HealthEquity@fda.hhs.gov)

 1-888-INFO-FDA  
(1-888-463-6332)

 @FDAHealthEquity



 **U.S. FOOD & DRUG**  
ADMINISTRATION

FDA Office of Minority  
Health and Health Equity





## B형 간염이란 무엇일까요?

B형 간염 바이러스(HBV)는 간의 염증을 유발합니다. 치료하지 않고 방치하면 평생 건강 문제와 심각한 간 손상을 초래할 수 있습니다. 아동과 성인의 HBV 감염을 예방하는 가장 좋은 방법은 예방 접종입니다.

B형 간염은 감염자의 혈액, 정액 또는 기타 체액과 접촉할 때 전염됩니다. 다음은 해당 바이러스에 감염될 수 있는 경로입니다.


- 감염된 파트너와의 성관계
- 주사침, 주사기 또는 약물 조제 장비 공유
- 출산 중 산모가 아이에게 전염
- 감염자의 혈액이나 상처와 접촉
- 주사침 또는 날카로운 기구에 노출
- 감염자와 물품(면도기, 칫솔 등) 공유

HBV는 다음을 통해 전염되지 **않습니다**.

- 음식이나 물
- 식기 공유
- 모유 수유
- 포옹
- 입맞춤
- 손잡기
- 기침
- 재채기



B형 간염이 급성(단기) 감염인 사람들도 있고 HBV가 체내에 남아 만성(장기) 감염이 되는 사람들도 있습니다. 만성 감염의 경우 흉터, 경화, 부전 등 심각한 간 손상으로 이어져 사망에 이를 수도 있습니다. HBV가 급성에서 만성으로 진행될 가능성은 연령에 따라 다릅니다. HBV 감염자의 연령대가 어릴수록 시간이 지나면서 만성 감염으로 발전할 가능성이 더 높아집니다.



## 검사를 받고 건강 상태를 확인해 보세요!

만성 HBV를 앓고 있는 사람들 중 다수가 겉으로 보기에는 아프거나 아프다고 느껴지지 않기 때문에 자신이 감염되었다는 사실을 모릅니다. 그렇더라도 다른 사람들에게 바이러스를 퍼뜨릴 수 있습니다.

혈액 검사를 통해 과거에 HBV에 감염되었는지, 현재 HBV에 감염된 상태인지 또는 감염되지 않았는지 여부를 파악할 수 있습니다. 만성 HBV 환자는 정기적으로 간 질환 징후를 확인하고 가능한 치료 옵션에 대해 평가를 받아야 합니다.



## B형 간염은 어떻게 치료할까요?

일반적으로 의료 서비스 제공자는 HBV가 만성화되지 않는 한 치료를 하지는 않습니다. 휴식을 취하고 건강에 좋은 음식과 다량의 수분을 섭취하는 것이 급성 HBV 회복에 도움이 됩니다.

만성 HBV 환자의 경우에는 치료를 시작하는 것과 관련하여 의료 서비스 제공자와 상담하십시오. 만성 HBV의 경우 세 가지 유형의 치료 옵션이 있습니다.

- **항바이러스제:** 신체가 바이러스와 싸우고 간 손상의 가능성을 낮추는 데 도움이 되는 경구 복용 약물
- **인터페론 주사:** 감염과 싸우기 위해 체내 세포에서 생성되는 물질인 인터페론이 함유된 주사제
- **간 이식:** 만성 B형 간염이 간부전이나 간암으로 발전되는 경우 최후의 수단으로서 간 이식을 해야 할 수도 있습니다. 이식은 건강에 해로운 간을 제거하고 기증자의 건강한 간으로 교체하는 수술입니다.

